

看取り時期ガイドライン スコア(10段階評価)

嗜好的変化 3項目		
■	今まで興味があったものに興味がなくなる	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	人に合わなくなる	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	味覚が変わってきた	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10()/30点
他覚的变化 14項目		
■	つじつまがあわない言動が見られる (せん妄)	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	寝ている時間が増える	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	呼吸苦が強くなっている	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	褥瘡が発生する、治癒しにくい	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	嚥下機能の低下が見られる	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	倦怠感が強くなっている	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	口腔内乾燥	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	鼻唇溝 (いわゆるほうれい線) が耳の下の方に下が	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	皮膚からの体内水分露出が増える	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	下肢筋力低下にて歩行困難、転倒が増える	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	便失禁 (タール便) が増える	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	排尿障害が見られる	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	抹消冷感 (チアノーゼ) が見られる	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	死前臭が強くなる	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10)/140点
機能的変化 13項目		
■	意識レベルの低下がみられる (JCSorGCS)	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	対光反射の減弱	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	閉眼困難が見られる	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	呼吸の変化 (チェーンストーク呼吸、下顎呼吸) が	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	呻吟呼吸の増加	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	死前喘鳴が見られる	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	血圧低下がみられる	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	橈骨動脈触知が減弱する	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	脈の著名は増減が見られる	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	尿量低下 (12時間で100ml以下) が見られる	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	体温調整が難しくなり、発熱しやすい	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	体重減少が見られる	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10
■	呼吸機能の低下 (Spo2低下) が見られる	1・2・3・4・5・6・7・8・9・10)/130点

()/300点

合計点数が300点中150点以上であれば“看取りの時期”と判断する

* 医学的な死の定義	
■	瞳孔散大
■	対光反射消失
■	心拍停止